© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



# Tausch-Catalog

## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Von den mit * bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2 Stücke geliefert.

| | | Mk. | | | Mk. |
|---|---|---|---|---|---|
| *Streptaxis* | | | *badia, Fér. | Guadel. | 0,50 |
| Wagneri, Pfr. | Bras. | 1,20 | Bainbridgei, Pfr. | Jam. | 3 |
| *Vitrina* | | | *bermudensis, Pfr. | Berm. | 0,50 |
| *limpida, Gould | N.-York | 0,50 | Boivini, Petit | Adm. I. | 1,50 |
| *Peifferia* | | | cicatricosa, Müll. | China | 0,50 |
| micans, Pfr. | Philipp. | 2 | cornu giganteum, Ch. | Madsc. | 2 |
| *Nanina* | | | *dentiens, Fér. | Mtnque. | 0,60 |
| Brookei A. et Reeve | Borneo | 12 | dictyodes, Pfr. | N. Cal. | 0,80 |
| citrina, L. | Ceram | 0,75 | erronea, Alb. | Ceylon | 0,80 |
| Cuvieriana, Lea | Polillo I. | 1,50 | excellens, Pfr. | Haiti | 6 |
| ligulata, Fér. | Madras | 0,50 | fringilla, Pfr. | Sal. I. | 0,80 |
| Lamarkiana, Lea | Philipp. | 3 | formosa, Fér. | Kl. Antillen | 0,60 |
| Humphreysiana, Lea | „ | 0,75 | Gaberti, Less. | Na. Hibern. | 0,80 |
| ovum, Valenc. | „ | 2,50 | haemastoma, L. | Ceylon | 0,25 |
| porphyria, Pfr. | „ | 2 | Hazardi, Bland | Tenn. | 0,50 |
| semiglobosa, Pfr. | „ | 2,50 | illustris, Pfr. | Cambd. | 7,50 |
| Zeus, Jonas | „ | 3 | imperator, Montf. | Cuba | 10 |
| rariguttata, Pfr. | Timor | 1 | Josephinae, Fér. | Glpe. | 0,50 |
| trifasciata, Chemn. | Bombay | 1 | Lambei, Pfr. | N. Hibern. | 1,25 |
| Weinkauffiana, Crosse | Cochin | 0,50 | lanx, Fér. | Mdgsc. | 2 |
| rectangula, Pfr. | Marquesas | 0,20 | lychnuchus, Fér. | Glpe. | 0,75 |
| Troilus, Gould | Tonga Tabu | 0,35 | Macgregoryi, Cox | Na. Hib. | 1,25 |
| Sophiae Gasc. | Na. Hibern. | 2 | „ decollata | | 0,25 |
| *Hyalina* | | | Mackensii. Ad. & Rve. | Japan | 1 |
| *capsella, Gld. | Tenes. | 0,50 | majuscula, Pfr. | Australia | 2,50 |
| *lasmodon, Phlps. | „ | 0,60 | marginella, Gmel. | Cuba | 0,80 |
| *inornata Say | N.-York | 0,60 | meta, Pfr. | Salom. I. | 0,80 |
| *lineata, Say | „ | 0,30 | migratoria, Pfr. | „ | 0,60 |
| *Macrocyclis* | | | nux denticulata, Chemn. | Mtque. | 1 |
| Vanconverensis, Lea | Cal. | 0,50 | oreas, Koch | N. Granada | 4,50 |
| *Sagda* | | | palavanica, Pfr. | Palav. | 3 |
| Cookiana, Gmel. | Jam. | 1 | parilis, Fér. | Gdlpe. | 0,40 |
| *Helix* | | | pellis serpentis, Chemn. | Bras. | 3,50 |
| acutissima, Lam. | Jam. | 0,80 | plicata, Born | Venezuela | 1,75 |
| ambrosia, Ang. | Adm. I. | 1 | polygyrata, Born | Bras. | 1,25 |
| anomala, Pfr. | Jam. | 0,50 | Rivolii, Desh. | Ceylon | 1,50 |
| atrata, Pfr. | Quito | 5 | | | |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| semirugata, Beck Beng. | 0,75 | pithogaster, Fér. Philipp. | 2 |
| sepulchralis, Fér. Mdgsc. | 0,80 | polychroa, Sow. „ | 1 |
| „ var. funebris „ | 1 | pulcherrima, Sow. „ | 1 |
| *similaris, Fér. Bras. | 0,20 | simplex, Jonas „ | 0,80 |
| Skinneri, Reeve Ceylon | 6 | speciosa, Jay „ | 1,25 |
| Sowerbiana, Fisch. Mdgsc. | 2,25 | sphaerica, Sow. „ | 1 |
| spinosa, Lea Teness. | 0,50 | stabilis, Sow. „ | 1 |
| Swinhoei, Pfr. Formosa | 9 | zonifera, Sow. „ | 2 |
| tenera, Reinh. Japan | 0,40 | tucanensis, Pfr. Sooloo. Ins. | 0,50 |
| tranquebarica, Fabr. Madras | 1 | *Anostoma* | |
| Trailli, Pfr. Palavan | 4,50 | ringens, L. Brasil. | 10 |
| trizonalis, Grat. Haiti | 3,50 | *Bulimus* | |
| undulata, Fér. St. Dom. | 4 | auris leporis, L. R. Jan. | 0,35 |
| unidentata, Ch. Seych. | 1,20 | bilabiatus Brod. Bras. | 3 |
| *varians, Mke. Baham. | 0,40 | crenulatus, Pfr. Chile | 0,60 |
| Waltoni, Reeve Ceylon | 3 | Cleryi, Petit Salom. Ins. | 8 |
| | | distortus, Brug. Venez. | 1 |
| *elata, F. B. It. mer. | 0,40 | fibratus, Mart. N. Cal. | 3 |
| * „ var. Sequenziana Ben. Sic | 0,50 | Founaki H. & Jacq. Sal. Ins. | 1,40 |
| *meda Posro It. mer. | 0,60 | fulguratus, Say Viti-I. | 1 |
| *verticillata, Parr. „ | 0,40 | fulminans, Nyst. Cumana | 2 |
| *subprofuga, Stabile Vesuv | 0,50 | glaber, Gmel. Venez. | 1 |
| *Cochlostyla* | | illheocola, Moric Bahia | 2,50 |
| annulata, Sow. Philipp. | 0,50 | miltocheilos, Nyst. Sal. I. | 2,50 |
| balteata, „ „ | 0,50 | odontostomus, Sow. Bras. | 3 |
| boholensis, Brod. „ | 1,20 | pupoides, Spix „ | 0,60 |
| calista, „ „ | 1,20 | planidens, Mitch. „ | 3 |
| calobapta, Jonas „ | 2 | pulicarius, Rve. N. Grenada | 1,50 |
| cepoides, Lam. „ | 6 | perdix, Pfr. „ | 2 |
| chrysalidiformis, Sow. „ | 2 | rosaceus, King Chile | 1 |
| cincinna, Sow. „ | 0,25 | signatus, Spix Bras. | 1 |
| (ohne Epid.) | | strangei, Pfr. Eddyst. I. | 1 |
| daphnis, Brod. „ | 2,50 | Wagneri, Pfr. | 1,20 |
| Hügeli, Pfr. „ | 1,20 | *Bulimulus* | |
| Hanleyi, Pfr. „ | 1 | anchistomus, Wagn. Bras. | 1,50 |
| iloconensis, Sow. „ | 0,60 | chilensis, Lesson Valpar. | 0,50 |
| intorta, Sow. „ | 0,80 | coquimbensis, Brod. Coquim | 1,50 |
| metaformis, Fér. „ | 1 | fulvicans, Pfr. Seych. | 1 |
| mirabilis, Fér. „ | 1 | *guadeloupensis Brug. St. Lucia | 0,25 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | | Mk. |
|---|---|---|
| Mariae, Albers | Mexico | 0,50 |
| peruviaaus, Brug. | Peru | 0,50 |
| proteus Brod. | „ | 0,80 |
| *Philippii, Pfr. | „ | 0,50 |
| vexillum, Wood | Truxillo | 0,40 |
| *virgulatus, Fér. | St. Thomas | 0,20 |
| *Achatina* | | |
| balteata, Reeve | Gambia | 5 |
| fulica, Fér. | Maur. | 0,75 |
| Kraussi, Reeve | Natal | 5 |
| panthera, Fér. | Madagascar | 1 |
| „ var. pallida | „ | 0,75 |
| rodostoma, Phil. | *Afr. occ.* | 3,50 |
| semisculpta, Pfr. | Benguela | 2,50 |
| fasciata, Müll. | Cuba | 0,50 |
| virginea, L. | St. Dom. | 0,50 |
| *Limicolaria* | | |
| Adansoni, Pfr. | Senegal | |
| typus | | 2,50 |
| div. vars. | | 1—2 |
| flammea, Müll. | Gaboon | |
| typus | | 2,50 |
| div. vars. | | 1—2 |
| Pyrrhus, Albers | Afr. occ. | 2 |
| tenebrica, Reeve | „ | 2 |
| *Perideris* | | |
| alabaster, Rang. | | 1,50 |
| *Pseudachatina* | | |
| Downesii, Gray | Gaboon | 7,50 |
| Wrigbtii, Sow. | „ | 7,50 |
| *Orthalicus* | | |
| Gallina sultana, Chm. | Guyana | 2 |
| phlogerus, d'Orb. | Angostura | 1,50 |
| princeps, Brod. | Panama | 1 |
| regina, Fér. | Bolivia | 4 |
| undatus, Brug. | Jam. | 0,25 |
| zebra, Müll. | Brasil. | 0,25 |
| *Porphyrobaphe* | | |
| mus Sow. | Guayaquil | 2,50 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| *Macroceramus* | | |
| *Guildingi, Pfr. | Cuba | 0,50 |
| *Mangeri, Wood | Jam. | 0,30 |
| *Clausilia* | | |
| *Adelinae, Ben. | Palermo | 0,60 |
| *Agesilaos, v. Mart. | Sparta | 0,50 |
| approximans, Ziegl. | Carn. | 0,50 |
| *Blanci, v. Mart. | Böotia | 0,45 |
| *bicristata Friv. | „ | 0,45 |
| *„ v. canaliculata, Pfr. | Delphi | 0,55 |
| *„ v. tetragonostoma, Pfr. | Parnass | 0,55 |
| *caerulea, Fér. | Syra | 0,60 |
| * „ f. antiparia, Bttg. | Antp. | 0,60 |
| * „ f. nia, Bttg. | Nia | 0,50 |
| * „ var. birugosa, Parr. | Santorin | 0,50 |
| *candidescens, Zgl. | It. mer. | 0,30 |
| * „ var. cinerea Phil. | „ | 0,25 |
| clandestina Rossm. | | |
| v. Thiesseae Bttg. | Thessalia | 1 |
| *coarctata, Mouss. | Phthiotis | 0,50 |
| *gibbula, Zgl. | It. mer. | 0,30 |
| * „ „ var. | Dalm. | 0,30 |
| *Grohmanni, Phil. | Palermo | 0,60 |
| *isabellina, Pfr. | Corinth | 0,50 |
| leucoraphe Blanc | I. Skiatho | 2 |
| *leucostigma, Ziegl. | Perugia | 0 35 |
| * v. candidilabris, Porro | Asc. Pic. | 0,40 |
| *maculosa, Desh. | Böotia | 0,45 |
| negropontina, Pfr. | | |
| *var. costulata, Thiesse | Euböa | 0,60 |
| ossetica A. Schm. | Kauk. | 0,60 |
| *osculans v. Mart. | Attica | 0,45 |
| *peucetana, Kobelt | Trani | 0,60 |
| *punctulata, Küst. | Umbr. | 0,40 |
| Reiniana, Kob. | Japan | 1 |
| „ ohne epidermis | | 0,50 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| sericata, Pfr. | | *Conchylien von Reichenhall.* | |
| v. bifilosa, Blanc Delphi | 1 | Von den grösseren Arten werden mindestens 2, von den kleineren 3—4 Stücke für den angesetzten Preis geliefert. | |
| *septemplicata Phil. Palm. | 0,60 | | |
| *Buliminus* | | Helix arbustorum, L. | 0,20 |
| *Bergeri, Roth Böotia | 0,60 | „ fruticum, Müll. | 0,20 |
| pusio Brod. Cyra | 0,60 | „ incarnata, Müll. | 0,25 |
| *Thiesseanus, Mouss. Böotia | 0,60 | „ rotuudata, „ | 0,15 |
| *Conchylien aus Südportugal.* | | „ rupestris, Drap. | 0,15 |
| Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben. | | „ lapicida, L. | 0,20 |
| *Helix lactea, Müll. | 0,40 | „ umbrosa, Partsch | 0,25 |
| * „ pisana, „ | 0,20 | Bulimus montanus Dr. | 0,15 |
| * „ virgata, Mont. | 0,30 | Claus. biplicata Mtg. | 0,15 |
| * „ apicina, Lam. | 0,20 | „ corynodes, Held | 0,25 |
| * „ lenticula, Fér. | 0,25 | „ dubia Dr. | 0,20 |
| * „ acuta, Müll. | 0,20 | „ parvula, Stud. | 0,15 |
| „ luteata, Parr. | 0,40 | *Pupa* avenacea Brug. | 0,15 |
| „ barbula, Charp. *var.* | 0,50 | „ dolium, Drap. | 0,25 |
| „ turriplana, Mor. | 0,50 | „ edentula Dr. | |
| „ Pringi, Pfr. | 0,50 | v. turritella, Wstld. | 0,50 |
| „ ponentina, Morelet | 0,50 | Succinea putris, L. | 0,15 |
| *Pupa umbilicata, Dr. | 0,15 | „ Pfeifferi, Rossm. | 0,15 |
| *Ferussacia Vescoi, Bourg. | 0,40 | Cionella lubrica Müll. | 0,15 |
| Stenogyra decollata, L. | 0,20 | Carychium minimum | 0,15 |
| Planorbis Dufouri, Graells *major* | 0,40 | Limnaea perega, Dr. v. curta, Clessin. | 0,20 |

Bei Baarzahlungen wird Rabatt gewährt;

Mitglieder des Tauschvereins erhalten 10%, Nichtmitglieder 5%.

Zum Tausch jeder Zeit bereit, bitten wir, uns nur tadellose Stücke zu offeriren, da wir unmöglich den an uns gestellten Anforderungen genügen können, wenn uns, wie das leider bisher geschah, mangelhafte Exemplare geliefert werden.

Die obigen Preise gelten für tadellose Exemplare. Bei nicht ganz vollkommenen Stücken tritt entsprechende Ermässigung ein. Wir machen hierauf die Herren Paläontologen aufmerksam, denen es weniger auf Prachtstücke ankommt. Im Tausch nehmen wir ausser fossilen Conchylien auch Insecten, Crustaceen etc.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren, Briefe einfach an die „**Linnaea**“, Naturhist. Institut Frankfurt a. M., Brönnerstr. 30.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Alt & Neumann in Frankfurt a. M.